

Inhaltsverzeichnis

Management der Triple-Therapie mit Telaprevir ... 1

- 1 Bei welchen Patienten ist die Behandlung mit Telaprevir indiziert? ... 1
- 2 Wie sieht das Behandlungsschema für therapienaive Patienten aus? ... 1
- 3 Wie sieht das Behandlungsschema für therapieerfahrene Patienten aus? ... 2
- 4 Wie ist das genaue Dosierungsschema von Telaprevir in Kombination mit Peginterferon alfa und Ribavirin? ... 3
- 5 Unter welchen Bedingungen besteht die Möglichkeit, bei therapienaiven Patienten die Behandlungsdauer zu verkürzen? ... 4
- 6 Unter welchen Bedingungen kann die Therapie bei Patienten verkürzt werden, die zuvor auf Peginterferon alfa/Ribavirin angesprochen hatten, dann aber einen Relapse erlitten haben? ... 4
- 7 Wie hoch sind die Ansprechraten gemäß den Phase-III-Studien bei therapienaiven Patienten? ... 5
- 8 Mit welchem Ansprechen kann man unter Telaprevir-basierter Triple-Therapie bei therapieerfahrenen Patienten rechnen? ... 6
- 9 Wie sind die virologischen Stoppregeln bei der Triple-Therapie mit Telaprevir definiert? ... 8
- 10 Wie hoch ist das Risiko, Telaprevir-resistente Viren zu selektionieren? ... 8
- 11 Welche Kontraindikationen gibt es bei der Triple-Therapie mit Telaprevir? ... 9
- 12 Welches sind die wichtigsten Wechselwirkungen von Telaprevir mit anderen Arzneimitteln? ... 10

Praktische Details ... 12

- 13 Warum ist eine gute Adhärenz der Patienten so wichtig, und wie lässt sich diese fördern? ... 12
- 14 Wie ist vorzugehen, wenn die Einnahme der Tabletten versäumt wurde? ... 13
- 15 Warum muss die Behandlung abgebrochen werden, wenn die Tabletteneinnahme mehrfach hintereinander versäumt wurde? ... 13
- 16 Wann sollte die Viruslast der Patienten während der Triple-Therapie mit Telaprevir bestimmt werden? ... 13

- 17 Welche Laboruntersuchungen außer der Bestimmung der Viruslast sind vor und während der Behandlung mit Telaprevir durchzuführen? ... 14
- 18 Welchen Einfluss hat die Ernährung auf die Triple-Therapie mit Telaprevir? ... 15
- 19 Dürfen die Tabletten geteilt werden? ... 15
- 20 Können die Tabletten über eine Sonde appliziert werden? ... 15
- 21 Dürfen die Tabletten außerhalb des Originalbehältnisses aufbewahrt werden, z. B. in einer Dosette? ... 16
- 22 Welche Empfehlungen zur Empfängnisverhütung gelten unter der Triple-Therapie? ... 16

Management von Nebenwirkungen ... 17

- 23 Mit welchen unerwünschten Wirkungen ist bei der Triple-Therapie mit Telaprevir zu rechnen? ... 17
- 24 Was ist zu tun, wenn ein Patient unter der Behandlung eine Anämie entwickelt? ... 17
- 25 Wie ist mit Hautausschlag (Rash) unter der Triple-Therapie mit Telaprevir umzugehen? ... 18

Besondere Patientengruppen ... 22

- 26 Wie lassen sich Patienten mit kompensierter Zirrhose behandeln? ... 22
- 27 Können Patienten mit Niereninsuffizienz oder Dialysepatienten mit Telaprevir-basierter Triple-Therapie behandelt werden? ... 23

Spezialfragen ... 24

- 28 Lässt sich durch eine Lead-in-Phase das Therapieansprechen auf die Triple-Therapie mit Telaprevir verbessern? ... 24
- 29 Lässt sich mithilfe des IL28B-Genotyps die Wahrscheinlichkeit des Therapieansprechens unter Telaprevir-basierter Behandlung prognostizieren? ... 25
- 30 Welche Möglichkeiten bleiben den Patienten, bei denen eine Behandlung mit Telaprevir-basierter Triple-Therapie fehlschlägt? ... 26

Literatur ... 27

Sachverzeichnis ... 28