

Ratgeber

Malawi-Cichliden-Zucht

Ralf Stanislawski · Torsten Weirauch

Einführung	5
Aquarien und Aquariengröße	7
Filterung	12
Pflanzen	17
Das Wasser	18
Fischkauf und Fischbesatz	22
Algenprobleme	25
Krankheiten	27
Futter	32
Zucht und Hälterung	37
Artenteil	45

<i>Protomelas</i>	<i>taeniolatus</i>	<i>chrysonotus</i>
	<i>similis</i>	<i>verduyni</i>
	<i>fenestratus</i>	<i>azureus</i>
	<i>annectens</i>	<i>virginalis</i>
	<i>labridens</i>	<i>jacksoni</i>
	<i>triaenodon</i>	<i>pleurostigmoides</i>
	<i>silonotus</i>	
<i>Stigmatochromis</i>	<i>woodi</i>	<i>Electrochromis</i> <i>lobochilus</i>
	<i>modestus</i>	<i>ornatus</i>
	<i>pholidophorus</i>	<i>Maravichromis</i> <i>lateristriga</i>
<i>Aristochromis</i>	<i>christyi</i>	<i>semipalatus</i>
<i>Chilotilapia</i>	<i>rhoadesii</i>	<i>melanonotus</i>
<i>Cyrtocara</i>	<i>moorii</i>	<i>sphaerodon</i>
<i>Cheilochromis</i>	<i>euchilus</i>	<i>Lethrinops</i> <i>macracanthus</i>
<i>Sciaenochromis</i>	<i>ahli</i>	<i>furcifer</i>
<i>Ctenopharynx</i>	<i>pictus</i>	<i>Dimidiochromis</i> <i>compressiceps</i>
<i>Trematocranus</i>	<i>placodon</i>	<i>kiwinge</i>
<i>Champsocromis</i>	<i>spilorhynchus</i>	<i>Aulonocara</i> <i>jacobfreibergi</i>
<i>Tyrannochromis</i>	<i>macrostoma</i>	<i>hansbaenschi</i>
<i>Buccochromis</i>	<i>lepturus</i>	<i>maylandi</i>
	<i>heterotaenia</i>	<i>walteri</i>
<i>Champsocromis</i>	<i>caeruleus</i>	<i>baenschi</i>
<i>Fossorochromis</i>	<i>rostratus</i>	<i>hueseri</i>
<i>Placidochromis</i>	<i>electra</i>	<i>korneliae</i>
	<i>milomo</i>	<i>saulosi</i>
	<i>johnstoni</i>	<i>stuartgranti</i>
	<i>subocularis</i>	<i>Hemitaeniochromis</i> <i>urotaenia</i>
<i>Naevochromis</i>	<i>chrysogaster</i>	<i>Otopharynx</i> <i>lithobates</i>
<i>Copadichromis</i>	<i>trimaculatus</i>	<i>Rhamphochromis</i> <i>macrophthalmus</i>
	<i>borleyi</i>	<i>Nimbochromis</i> <i>fuscotaeniatus</i>
		<i>linni</i>
		<i>venustus</i>
		<i>livingstonii</i>