

| | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----|
| Arzneimittelprofile | 7 | Fentanyl | 54 |
| Acetylcystein (ACC) | 7 | Flumazenil | 55 |
| Acetylsalicylsäure (ASS) | 8 | Furosemid | 56 |
| Adenosin | 9 | Glukagon | 57 |
| Adrenalin (Epinephrin) | 10 | Glukose 40% | 58 |
| Ajmalin | 13 | HAES 6% | 59 |
| Alteplase (t-PA) | 14 | Haloperidol | 60 |
| Amiodaron | 17 | Heparin-Natrium | 61 |
| Atracurium | 18 | Hydrocortison | 63 |
| Atropin | 20 | Hydroxycobalamin | 64 |
| Beclometason | 21 | Ibuprofen | 65 |
| Biperiden | 22 | Insulin | 66 |
| Butylscopolamin | 23 | Ipecacuanha | 67 |
| Cafedrin + Theodrenalin | 24 | Ipratropiumbromid | 68 |
| Cimetidin | 25 | Kalziumglukonat | 69 |
| Clemastin | 26 | Ketamin | 70 |
| Chloralhydrat | 27 | Kohle, medizinische | 72 |
| Clonazepam | 28 | Lidocain | 73 |
| Clonidin | 29 | Lorazepam | 74 |
| Clopidoget | 30 | Magnesiumsulfat | 75 |
| Dexamethason | 31 | Mannitol 20% | 76 |
| Diazepam | 32 | Mepivacain | 77 |
| Diclofenac | 34 | Metamizol | 78 |
| Dihydralazin | 35 | Methylprednisolon | 79 |
| Digitalis-Antitoxin | 36 | Metoclopramid | 80 |
| Digoxin | 37 | Metoprolol | 81 |
| Dimenhydrinat | 38 | Midazolam | 82 |
| Dimercaptopropansulfonat (DMPS) | 39 | Morphin | 84 |
| Dimethylaminophenol (4-DMAP) | 40 | Naloxon | 85 |
| Dimetinden | 41 | Natrium-Bikarbonat | 86 |
| Dobutamin | 42 | Natriumchlorid | 87 |
| Dopamin | 44 | Natriumthiosulfat | 88 |
| Enoxaparin | 45 | Nifedipin | 89 |
| Esketamin | 47 | Nitrendipin | 90 |
| Esmolol | 49 | Nitroglycerin (Glyceroltrinitrat) | 91 |
| Ethanol | 50 | Noradrenalin (Norepinephrin) | 92 |
| Etomidat | 51 | Obidoximchlorid | 93 |
| Fenoterol | 52 | Ondansetron | 94 |
| | | Orciprenalin | 95 |
| | | Oxybuprocain | 96 |

6 Inhalt

| | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------------|
| Oxytocin | 97 | |
| Paracetamol | 98 | |
| Pethidin | 100 | Algorithmen |
| Phenytoin | 101 | Reanimation des Neugeborenen |
| Physostigmin | 103 | Basismaßnahmen bei Kindern (BLS) |
| Piritramid | 104 | Erweiterte lebensrettende |
| Prednisolon | 105 | Maßnahmen bei Kindern (ALS) |
| Promethazin | 106 | Lebensrettende Basismaßnahmen |
| Propafenon | 107 | bei Erwachsenen (BLS) |
| Propofol 1% | 109 | Universeller Reanimationsalgorithmus |
| Reprotorol | 111 | Erwachsene (ALS) |
| Ringer-Laktat | 112 | Innerklinische Reanimation |
| Rocuronium | 113 | Definition des Akuten Koronar- |
| Salbutamol | 114 | syndroms (ACS) |
| Sauerstoff | 115 | Vorgehen beim Akuten |
| Simeticon | 117 | Koronarsyndrom |
| Suxamethoniumchlorid | 118 | Vorgehen bei Tachykardie |
| Tenecteplase | 119 | Vorgehen bei Bradykardie |
| Terbutalin | 120 | Vorgehen bei Anaphylaxie |
| Theophyllin | 121 | |
| Thiopental | 123 | |
| Tirofiban | 125 | Index |
| Toloniumchlorid | 127 | |
| Tramadol | 128 | |
| Tranexamsäure | 129 | |
| Urapidil | 130 | |
| Vecuronium | 131 | |
| Verapamil | 132 | |
| Vollelektryolytlösung | 134 | |