

betapharm Arzneimittel GmbH

Kobelweg 95, 86156 Augsburg

Telefon: (08 21) 7 48 81-0

Telefax: (08 21) 7 48 81-420

E-Mail: Callcenter@betapharm.de

Internet: www.betapharm.de

Ansprechpartner für Haltbarkeitsdaten/Verkauf/Retouren/

Lieferanfragen:

Kunden-Service

Telefon: (08 00) 7 48 81-00

Telefax: (08 00) 7 48 81-20

Auslieferung/Distribution/Retourenlager:

NextPharma

Niederlassung Werne

Retourenabteilung

Eichenbusch 1

59368 Werne

Retouren bitte ausschließlich an unser Retourenlager – Firma Next-Pharma – senden.

Haltbarkeit bei sachgemäßer Lagerung:

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Abacavir-Lamivudin beta 600 mg/300 mg, Filmtabletten	36	
Aciclobeta® 400/-800, Tabl.	60	
Aciclobeta® Creme	48	
Aciclobeta® Lippenherpes Creme	48	
Alendron beta® einmal wöchentlich 70 mg Tabletten	36	nicht über 25 °C
Alfuzosin beta 10 mg retard Retardtabletten	60	nicht über 30 °C
Allobeta® 100/-300, Tabl.	60	
Ambrobeta® 30, Brausetabl.	36	nicht über 30 °C lagern, Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit schützen

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Ambrobeta® Saft	24	Inhalt vor Licht schützen, nach Anbruch 12 Monate haltbar
Amoxibeta® 1000 OP14, Tabl.	36	nicht über 25 °C
Amoxibeta® 750 mg/-1000 mg Tabs, Trinktabl.	24	nicht über 25 °C
Amoxibeta® T 1000, Tabl.	36	nicht über 25 °C
Anagrelid beta 0,5 mg Hartkapseln	36	nicht über 30 °C
Anastrozol beta 1 mg Filmtabletten	48	
Aripiprazol beta 1 mg/ml Lösung zum Einnehmen	24	vor Licht schützen, nicht im Kühl-schrank aufbewahren oder einfrieren, nach Anbruch 6 Monate haltbar
Aripiprazol beta 5 mg/-10 mg/-15 mg/-20 mg/-30 mg Tabletten	36	
Aripiprazol beta 10 mg/-15 mg Schmelztabletten	24	Inhalt vor Feuchtigkeit schützen
Azathioprin beta® 50 mg Filmtabletten	36	
Bendamustin beta 2,5mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	24	Vor Licht schützen, verdünnt bei 2 °C–8 °C für 24 Stunden haltbar
Biotin beta 5, Tabl.	48	
Bisobeta® 5/-10, Filmtabl.	60	
Bisobeta® comp 5 mg/12,5 mg/-10 mg/25 mg, Filmtabl.	60	Inhalt vor Licht schützen
Buprenorphin beta 35/-52,5/-70µg/h transdermales Pflaster	36	
Calcium D3 beta®, Brausetabl.	36	Inhalt vor Feuchtigkeit schützen, nach Anbruch 4 Wochen haltbar
Capecitabin beta 150 mg Filmtabletten	36	nicht über 30 °C
Capecitabin beta 500 mg Filmtabletten	24	nicht über 30 °C
Captobeta® 25/12,5 comp, 25/25 comp/-50/25 comp, Tabl.	36	nicht über 25 °C

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Caspofungin beta 50 mg/-70 mg Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	24	Stammlösung 24 h bei 25 °C, verdünnt für Patienten: 24 h bei 2–8 °C
Celecoxib beta 100 mg/-200 mg Hartkapseln	30	
Cetirizin beta®, Filmtabl.	36	
Cetirizin beta® Tropfen	36	nach Anbruch 6 Monate haltbar
Ciprobeta® 250 mg/-500 mg Filmtabletten	36	
Citalopram beta 20 mg/-40 mg Film-tabletten	48	
Citalopram beta 30 mg Filmtabletten	36	
Clozapin beta® 25 mg/-50 mg/-100 mg/-200 mg Tabletten	48	
Cyproteronacetat beta 50 mg/-100 mg, Tabletten	36	
Diclo® dispers, Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen	48	nicht über 30 °C
Diclofenbeta® 100, Supp.	48	nicht über 25 °C lagern, Inhalt vor Licht schützen
Dipyridamol ASS beta 200 mg/25 mg Retardkapseln	24	Inhalt vor Feuchtigkeit schützen, nach Anbruch 30 Tage haltbar
Docetaxel beta 20 mg/1 ml/-80 mg/4 ml/-160 mg/8 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	24	nicht über 25 °C, nicht einfrieren, verdünnt bei 2 °C bis 8 °C für 48 Std. bzw. bei 25 °C für 6 Std. haltbar.
Domperidon beta 10 mg Tabletten	36	nicht über 30 °C, Inhalt vor Feuchtigkeit schützen
Donepezil-HCl beta 5 mg/10 mg Filmtabletten	36	
Donepezil-HCl beta 10 mg Schmelztabletten	60	

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Duloxetin beta 30 mg magensaft- resistente Hartkapseln	24	vor Licht und Feuchtigkeit schützen
Duloxetin beta 60 mg magensaftresistente Hartkapseln	24	vor Feuchtigkeit schützen
Duloxetin beta 45 mg magensaft- resistente Hartkapseln	18	vor Feuchtigkeit schützen, nicht über 30 °C
Duloxetin beta URO 20 mg/-40 mg magensaftresistente Hartkapseln	36	Inhalt vor Feuchtig- keit schützen, nicht über 30 °C
Efavirenz/Emtricitabin/Tenofovirdiso- proxil beta 600 mg/200 mg/ 245 mg Filmtabletten	24	nach erstem Öffnen 30 Tage
Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil beta 200 mg/245 mg Filmtabletten	36	nach Anbruch 30 d < 25 °C, Inhalt vor Feuchtigkeit schützen
Eplerenon beta 25 mg/-50 mg Filmtabletten	36	
Enabeta® comp 10 mg/25 mg, Tabl.	36	nicht über 25 °C, Inhalt vor Feuchtig- keit schützen
Entecavir beta 0,5 mg/-1mg Film- tabletten	24	nicht über 30 °C
Escitalopram beta 5 mg/-10 mg /-15 mg/-20 mg Filmtabletten	48	
Etoricoxib beta 30 mg/-60 mg/ -90 mg/-120 mg Filmtabletten	24	-
Exemestan beta 25 mg Filmtabletten	36	
Exetimib beta 10 mg Tabletten	36	vor Feuchtigkeit schützen
Fentanyl beta 12 µg/h/- 25 µg/h/-50 µg/h/ -75 µg/h/-100 µg/h Matrixpflaster	24	
Fluoxetin beta 20, Hartkaps.	48	nicht über 25 °C
Fluoxetin beta 20/-40, Tabl.	48	nicht über 30 °C
Fondaparinux beta 2,5 mg/0,5 ml, -5 mg/0,4 ml, -7,5 mg/0,6 ml, -10 mg/0,8 ml Injektionslösung Fertigspritze	24	

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Fulvestrant beta 250 mg Injektionslösung in einer Fertigspritze	24	bei 2–8 °C lagern und transportieren
Furobeta® 40, Tabl.	60	vor Licht schützen
Furobeta® 250 mg, Tabl.	36	vor Licht schützen
Furobeta® 500, Tabl.	36	vor Licht schützen
Gabapentin beta 100 mg/–300 mg/–400 mg Hartkapseln	36	nicht über 25 °C
Gabapentin beta 600 mg/–800 mg Filmtabletten	36	nicht über 25 °C
Gingobeta® 40 mg/–80 mg/–120 mg/–240 mg Filmtabletten	60	nicht über 30 °C
Granisetron beta 2 mg Filmtabletten	36	
HCT beta® 12,5/–25, Tabl.	48	nicht über 25 °C, Inhalt vor Feuchtigkeitschützen
Hydromorphon beta 1,3 mg/–2,6 mg Hartkapseln	24	
Hydromorphanhydrochlorid beta 2 mg/–4 mg/–8 mg/–16 mg/–24 mg Retardkapseln	24	nicht über 25 °C
Ibandronsäure beta 3 mg Injektionslösung	36	
Ibubeta® 400/–400 akut, Filmtabl.	48	
Ibubeta® 600, Filmtabl.	60	
Ibubeta® 800, Filmtabl.	36	
Imatinib beta 100 mg/–400 mg Filmtabletten	24	
Imatinib beta 100 mg/–400 mg Hartkapseln	36	nicht über 30 °C, vor Feuchtigkeit schützen
Ivabradin beta 2,5 mg/–5 mg/–7,5 mg	24	
Lamotrigin beta 50 mg/–100 mg/–200 mg Tabletten zur Herst. einer Susp. z. Einnehmen	60	nicht über 30 °C
Letrozol beta 2,5 mg Filmtabletten	36	
Levetiracetam beta 250 mg/–500 mg/–750 mg/–1000 mg Filmtabletten	36	
Levobeta® C 100/25/–200/50, Tabletten	36	
Levobeta® C 100/25 mg retard/–200/50 mg retard Retardtabletten	48	

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Levodopa Benserazid beta 100 mg/25 mg Tabletten	36	nicht über 25 °C, Inhalt vor Feuchtig- keit schützen
Levodopa/Carbidopa/Entacapon beta 50 mg/12,5 mg/200 mg/-75 mg/ 18,75 mg/200 mg/-100 mg/25 mg/ 200 mg/-125 mg/31,25 mg/200 mg/ -150 mg/37,5 mg/200 mg/-175 mg/ 43,75 mg/200 mg/-200 mg/50 mg/ 200 mg Filmtabletten	24	nicht über 25 °C
Linezolid beta 2 mg/ml Infusionslösung	30	Inhalt vor Licht schützen, nach Öffnen sofort verwenden, es sei denn, ein Kontaminations- risiko kann durch die Art des Öffnens ausgeschlossen werden
Linezolid beta 600 mg Filmtabletten	24	
Loperhoe®, Tabletten	60	
Lovabeta® 10 mg/-20 mg/-40 mg Tabletten	36	
L-Thyroxin beta® 25 µg, Tabletten	18	nicht über 25 °C, Inhalt vor Licht schützen
L-Thyroxin beta® 50 µg/-75 µg/-100 µg/ -125 µg/-150 µg/-175 µg/-200 µg, Tabl.	24	nicht über 25 °C Inhalt vor Licht schützen
Lysandra beta®, Tabletten	24	Inhalt vor Licht schützen
Macrogol beta plus Elektrolyte Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen	36	nicht über 25 °C lagern, Lösung zugedeckt im Kühlschrank
M-beta® 10/-30/-60/-100, Retardtabletten	60	24 Stunden haltbar Inhalt vor Licht schützen
Memantinhydrochlorid beta 10 mg/ -20 mg Filmtabletten	36	

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Memantinhydrochlorid beta Startpackung 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg Filmtabletten	36	
Memantinhydrochlorid beta 10 mg/–20 mg Schmelztabletten	48	
Memantinhydrochlorid beta® 10 mg/ml Lösung zum Einnehmen	36	nach Anbruch 12 Wochen haltbar
Metobeta® 50/–100, Tabl.	36	
Metobeta® 100 retard, Retardtabl.	36	
Metobeta® 200 retard, Retardtabl.	36	nicht über 25 °C
Mirtazapin beta 15 mg/–30 mg/–45 mg Filmtabletten	36	
Mirtazapin beta 15 mg/–30 mg/–45 mg Schmelztabletten	36	Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit schützen
Moclobeta® 150 mg/–300 mg Filmtabletten	60	
Moxobeta® 0,2 mg Filmtabletten	24	nicht über 30 °C
Moxobeta® 0,3 mg/–0,4 mg Filmtabletten	36	nicht über 30 °C
Mykohaug® 3 Kombi, Kombipack.	36	nicht über 25 °C, Creme nach Anbruch 1 Jahr haltbar
Mykohaug® C, Creme	36	nach Anbruch d. Tube 1 Jahr haltbar
Mykohaug® C 3, Vaginaltabl.	36	nicht über 25 °C
Mykohaug® C 3, Vaginalcreme	36	nach Anbruch d. Tube 4 Wochen haltbar
Nevirapin beta 200 mg Tabletten	36	–
Nevirapin beta 400 mg Retardtabletten	24	–
Olanzapin beta 2,5 mg/–5 mg/–7,5 mg/ –10 mg/–15 mg/–20 mg Filmtabletten	24	nicht über 25 °C
Olanzapin beta 5 mg/–10 mg/–15 mg/ –20 mg Schmelztabletten	24	nicht über 25 °C
Omebeta® 20/–40, magensaftresistente Hartkapseln	24	nicht über 25 °C
Ondansetron beta i. v. 8 mg, Injekt.-Lsg.	60	

B

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Oxaliplatin beta 5 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	24	nicht über 25 °C, nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren, Inhalt vor Licht schützen, Lösung 48 Stunden bei 2 °C bis 8 °C haltbar
Oxycodon-HCl beta 5 mg Retardtabletten	36	
Oxycodon-HCl beta 10 mg Retardtabletten	36	nicht über 30 °C
Oxycodon-HCl beta 20 mg/-30 mg/-40 mg/-60 mg/-80 mg Retardtabletten	48	
Oxycodon-HCl beta 1x täglich 10 mg/-20 mg/-40 mg/-80 mg Retardtabletten	48	
Oxycodon-HCl beta akut 5 mg/-10 mg/-20 mg Hartkapseln	24	nicht über 30 °C
Oxycodon-HCl/Naloxon-HCl beta 5 mg/2,5 mg, -10 mg/ 5 mg, -20 mg/10 mg, -30 mg/15 mg, -40 mg/20 mg Retardtabletten	36	nicht über 25 °C
Palonosetron beta 250 Mikrogramm Injektionslösung	36	nach Öffnen sofort verwenden
Pantoprazol beta 20 mg/-40 mg, magensaftresistente Tabletten	48	nicht über 30 °C
Pantoprazol beta 20 mg acid magensaftresistente Tabletten	48	nicht über 30 °C
Paroxetin beta 10 mg/-20 mg/-30 mg/-40 mg Tabletten	36	
Pregabalin beta 25 mg/-50 mg/-75 mg/-100 mg/-150 mg/-200 mg/-225 mg/-300 mg Hartkapseln	24	nicht über 30 °C
Quetiapin beta 25 mg/-100 mg/-200 mg/-300 mg Filmtabletten	36	nicht über 30 °C
Ramipril beta® 2,5 mg, Tabletten	24	nicht über 25 °C
Ramipril beta® 5 mg/-10 mg, Tabletten	24	nicht über 30 °C
Ramipril beta® comp 2,5 mg/12,5 mg/-5 mg/25 mg, Tabletten	24	nicht über 25 °C
Ranibeta® 150/-300, Filmtabletten	36	nicht über 25 °C
Rasagilin beta 1 mg Tabletten	24	

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Riluzol beta 50 mg Filmtabletten	36	Inhalt vor Licht schützen
Rivastigmin beta® 1,5 mg/-3 mg/-4,5 mg Hartkapseln	24	
Rivastigmin beta 4,6 mg/24 Stunden/-9,5 mg/24 Stunden transdermales Pflaster	36	
Sertralina beta 50 mg/-100 mg Filmtabletten	36	
Sildenafil beta 20 mg Filmtabletten	36	-
Simvabeta® 5 mg/-10 mg/-20 mg/-30 mg/-40 mg Filmtabletten	36	nicht über 30 °C
Simvabeta® 80 mg Filmtabletten	24	nicht über 25 °C
Spirobeta® 50 mg/-100 mg, Tabletten	36	
Sumatriptan beta 50 mg/-100 mg Filmtabletten	24	nicht über 25 °C
Tadalafil beta 5 mg/-10 mg/-20 mg Filmtabletten	36	-
Tadalafil beta PAH® 20 mg Filmtabletten	36	-
Tamsulosin beta 0,4 mg retard Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung	36	
Tenofovirdisoproxil beta 245 mg Filmtabletten	36	nach dem Öffnen 30 d nicht über 25 °C
Terbinafin beta 250 mg Tabletten	36	nicht über 25 °C
Tilicomp beta® 50 mg/4 mg Retardtabletten	24	nicht über 30 °C
Tilicomp beta® 100 mg/8 mg/-150 mg/12 mg Retardtabletten	36	nicht über 30 °C
Tramabeta® Tropfen zum Einnehmen, Lösung	36	nach Anbruch 2 Jahre haltbar
Tramabeta® long 100 mg/-150 mg/-200 mg Retardtabletten	36	nicht über 25 °C, Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit schützen
Valpro beta® Tropfen zum Einnehmen, Lösung	36	nach Anbruch 4 Monate haltbar
Valpro beta® 150, magensaftresistente Filmtabletten	24	nicht über 30 °C, Inhalt vor Feuchtigkeit schützen
Valpro beta® 300/-600, magensaftresistente Filmtabletten	36	nicht über 30 °C, Inhalt vor Feuchtigkeit schützen

Produkt	Haltbarkeitsdauer Monate	Lagerhinweise und Aufbrauch für Anbrüche
Valpro beta® chrono 300 mg/ –500 mg Retardtabletten	36	
Venlafaxin beta 37,5 mg Tabletten	36	
Venlafaxin beta 37,5 mg/–75 mg/ –150 mg Hartkapseln, retardiert	36	
Voriconazol beta 50 mg/–200 mg Filmtabletten	36	
Voriconazol beta 200 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung	36	Verdünt bei 2 °C–8 °C für 24 Stunden haltbar
Zink beta® 25 mg, Brausetabletten	36	Inhalt vor Feuchtig- keit schützen, nach Anbruch 12 Monate haltbar
Ziprasidon beta 20 mg/–40 mg/ –60 mg/–80 mg Hartkapseln	24	nicht über 30 °C
Zoledronsäure beta 4 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung	24	verdünt bei 2 °C–8 °C für 24 Stunden haltbar
Zoledronsäure beta 4 mg/100 ml Infusionslösung	24	verdünt bei 2 °C–8 °C für 24 Stunden haltbar
Zonisamid beta 25 mg/–50 mg/–100 mg Hartkapseln	36	