




Nerven von Becken und Bein (rechtes Bein von lateral)



361, 364–365, 482, 486–491, 496–498, 501, 504–505, 511

Nerven von Becken und Bein

Plexus lumbalis (Th₁₂–L₄)

- **Rr. musculares** (für Mm. intertransversarii, M. quadratus lumborum, M. psoas major und minor)
- **N. iliohypogastricus** (für Haut der Symphysenregion und Bauchmuskulatur)
- **N. ilioinguinalis** (für äußeres Genitale [Rr. scrotales bzw. labiales ant.] und Bauchmuskulatur)
- **N. genitofemoralis** (mit R. femoralis und R. genitalis für Leistenregion und Hodenhüllen bzw. Labien)
- **N. cutaneus femoris lat.** (zur Oberschenkelhaut)

N. obturatorius mit R. ant. und R. post. (für Adduktoren, M. pectineus und M. gracilis; Hautast zur Innenseite des Oberschenkels)

N. femoralis

- **Rr. cutanei femoris ant.** (zur Vorderseite des Oberschenkels)
- **Rr. musculares** (für M. pectineus, M. sartorius und M. quadriceps femoris)
- **N. saphenus** (Hautäste an der Medialseite des Unterschenkels [R. infrapatellaris] und am Fuß [Rr. cutanei cruris med.])

Plexus sacralis (L₄–S₃)

- **N. gluteus sup.** (für M. gluteus medius und minimus, M. tensor fasciae latae)
- **N. gluteus inf.** (für M. gluteus maximus und die kleinen Außenroller)
- **N. cutaneus femoris post.** (Hautäste für die Dorsalseite des Oberschenkels und den Damm)
- **N. ischiadicus** (für die kleinen Außenroller des Hüftgelenks, die ischiokruralen Oberschenkelmuskeln und den gesamten Unterschenkel und Fuß)
- **N. fibularis communis**
 - **N. cutaneus surae lat.** (Hautast zum Unterschenkel; verbindet sich mit dem N. cutaneus surae med. zum N. suralis)
 - **N. fibularis superf.** (für M. peroneus longus und brevis sowie für die Haut von Unterschenkel und Fuß)
 - **N. cutaneus dorsalis med. und intermedius** (zur Haut des Fußrückens)

- **N. fibularis prof.** (für die Extensoren des Unterschenkels)
 - **Nn. digitales dorsales hallucis lat. et digiti secundi med.** (Hautäste für die Innenflächen der 1. und 2. Zehe)
- **N. tibialis**
 - **N. cutaneus surae med.** (Hautast zum Unterschenkel)

N. suralis (wird aus N. cutaneus surae lat. und med. gebildet; zur Haut von Unterschenkel und Fuß)

- **N. plantaris lat.** mit R. superf. (für die Haut der lateralen 1 1/2 Zehen) und R. prof. (für Muskeln der Kleinzehenloge, M. adductor hallucis, Mm. lumbricales III und IV, M. quadratus plantae, alle Mm. interossei und den lateralen Kopf des M. flexor hallucis brevis)
- **N. plantaris med.** (für Muskeln der Großzehenloge, Mm. lumbricales I und II, M. flexor digitorum brevis und die Haut der medialen 3 1/2 Zehen)

Plexus pudendus (S₂–S₄)

- **Rr. musculares** (für M. levator ani und M. coccygeus)
- **N. pudendus (S₂–S₄)**
 - **Nn. rectales inf.** (zum M. sphincter ani ext. und zur Anahaut)
 - **Nn. perineales** (zum M. ischiocavernosus und bulbospongiosus, M. transversus perinei prof. und superf., zur Haut der Dammregion)
 - **N. dorsalis penis/clitoridis** (für M. transversus perinei prof. und äußeres Genitale)

Plexus coccygeus (S₅, Co_{1–3})

- **Nn. anococcygei**