

	$\bar{x}$	s
Handlänge	71	4
Os metacarpale III	15	1
Basophalanx III	12	0
Mesophalanx III	8	1
Telephalanx III	5	1

Abmessungen der Handknochen von Knaben im Alter von 0 Jahren (n = 70)


Noch keine Handwurzelknochen sichtbar.



	$\bar{x}$	s
Handlänge	82	4
Os metacarpale III	17	2
Basophalanx III	13	1
Mesophalanx III	9	1
Telephalanx III	6	0
Os capitatum	H 2	2
	B 2	1
Os hamatum	H 1	1
	B 1	1

Abmessungen der Handknochen von Knaben im Alter von ¼ Jahr (n = 46)

1 Os capitatum und Os hamatum eben sichtbar.



	$\bar{x}$	s
Handlänge	87	5
Os metacarpale III	19	1
Basophalanx III	15	1
Mesophalanx III	10	1
Telephalanx III	6	1
Os capitatum	H 4	3
	B 4	1
Os hamatum	H 3	4
	B 3	1

Abmessungen der Handknochen von Knaben im Alter von ½ Jahr (n = 56)

1 Doppelt konturierte Ecken an den distalen Enden der Ossa metacarpalia II–V.

2 Os capitatum und Os hamatum deutlich, rund.



Abmessungen der Handknochen von Knaben im Alter von ¾ Jahr (n = 33)

1 Os capitatum entrundet.

	$\bar{x}$	s
Handlänge	93	5
Os metacarpale III	21	2
Basophalanx III	17	1
Mesophalanx III	11	1
Telephalanx III	6	1

	$\bar{x}$	s
Os capitatum	H 5	1
	B 4	1
Os hamatum	H 4	1
	B 4	1
Distale Radiusepiphyse	H 1	1
	B 1	2



