

Arzneistoff mit Höchstdosen	Applikation	Einzel-dosis, Konz.	Dosierungshinweise, Bemerkungen	Status
<b>Famiciclovir</b>	p.o.	250 mg	3 × tägl. 250 mg. Cave: Niereninsuffizienz	Rp
<b>Famotidin</b>	p.o.	40 mg	Therapie: 1 × tägl. abends; Prophylaxe: 1 × tägl. abends 20 mg	Rp*)
	i.v.	20 mg	Alle 12 h	
*) ausgenommen bis 10 mg/abgeteilte Form bzw. 140 mg/Packung; zur Kurzzeitanwendung ab dem 16. Lebensjahr bei Sodbrennen und saurem Aufstoßen u. max. 14 Tage Therapiedauer				
<b>Fampridin</b>	p.o.	10 mg	2 × tägl. 10 mg im Abstand von 12 Std. auf nüchternen Magen. Cave: eingeschränkte Nierenfunktion	Rp
<b>Febuprol</b>	p.o.	100 mg	3 × tägl.	Rp
<b>Febuxostat</b>	p.o.	80 mg	1 × tägl. 80 mg	Rp
<b>Fedratinib-Dihydrochlorid-Monohydrat</b>	p.o.	400 mg	1 × tägl. 400 mg. Cave: bei schweren Nierenfunktionsstörungen (CrCl 15–29 ml/min) Dosisreduktion auf 200 mg/d	Rp
<b>Felbamat</b>	p.o.	400–600 mg	Ab 14. Lebensjahr, initial: 650–1200 mg/d, in 2–3 ED; durch wöchentliche Steigerung von 600–1200 mg/d bis 3600 mg/d in 3–4 ED. Cave: antiepileptische Begleittherapie ist anzupassen	Rp
<b>Felbinac</b>	Gel	3 %	2–4 × tägl. auftragen	
<b>Felodipin</b>	p.o. ret.	5 mg	1 × tägl. 5 mg morgens; bei Bedarf Erhöhung auf 1 × tägl. 10 mg. Cave: bei älteren Patienten und Leberinsuffizienz ggf. Dosisreduktion	Rp
<b>Felypressin</b>	i.v.	5 IE/ml	Gewebsinfiltration: 2–5 IE in 2–50 ml isotonischer Kochsalzlösung. Zusatz zur Lokalanästhesie: 5–10 IE in 30–100 ml je nach Gewebedurchblutung	Rp
	i.v. Infusion	10 IE	In 200 ml isotonischer Lösung bei Oesophagus-Varizen-Blutung, in 500 ml Blutersatz bei Kollaps, je nach Kreislaufzustand auch mehr	
<b>Fenbufen</b>	p.o.	300 mg	3 × tägl. Bei Langzeittherapie 1 × 600 mg möglich. Laborbefunde alle 6–8 Wochen	Rp
<b>Fencamfamin</b>	p.o.	10 mg	1 × morgens; bei Bedarf morgens u. mittags	Rp, BtM*)
*) verkehrsfähig, aber nicht verschreibungsfähig				
<b>Fendilin</b>	p.o.	50 mg	3 × tägl.	Rp
<b>Fenetyllinhydrochlorid</b>	p.o.	5 mg	Initial: 0,3–1,0 mg/kg KG morgens und mittags, max. TD: 100 mg	Rp, BtM
<b>Fenfluramin</b>	p.o.	20 mg	3 × tägl. (vor den Mahlzeiten). Erhöhung auf 3 × 40 mg möglich; Kinder 6–8 J.: 1 × 20 mg	Rp, AMG § 5

Arzneistoff mit Höchstdosen	Applikation	Einzel-dosis, Konz.	Dosierungshinweise, Bemerkungen	Status
<b>Fenfluramin hydrochlorid</b>	p.o.	2,2 mg/ml	Initial: Erw. und Kinder ab 2. Jahren: 2 × tägl. 0,1 mg/kg KG, Dosisanpassung: Dosis kann nach 7 Tagen auf 2 × tägl. 0,2 mg/kg KG und ggf. 2 × tägl. 0,35 mg/kg KG nach weiteren 7 Tagen erhöht werden, Maximaldosis: 2 × tägl. 13 mg/kg KG	Rp
<b>Fenipentol</b>	p.o.	100 mg	3 × tägl. 100–200 mg	
<b>Fenofibrat</b>	p.o. p.o. ret.	100 mg 250 mg	2 Einzeldosen morgens, 1 × abends 1 × morgens Bei eingeschränkter Nierenfunktion (eGFR 30–59 ml/min/1,73 m <sup>2</sup> ) Reduktion der Dosis auf 100 mg/d. Keine Anwendung bei eGFR unter 30 ml/min/1,73m <sup>2</sup>	Rp
<b>Fenoprofen</b>	p.o.	600 mg	3–4 × tägl. Vorsicht bei gleichzeitiger Anwendung von Antikoagulanzien der Cumarylreihe und bei Magengeschwür	Rp
<b>Fenoterol</b>	p.o. Dosieraerosol	2,5 mg 0,2 mg	3 × tägl. Im Asthmaanfall: 1 Stoß. Prophylaktisch: 3 × tägl. 1 Stoß	Rp*)
*) ausgenommen zur Notfalltolyse bis zu 5 Amp. zu 25 µg/4 ml zur Abgabe an Hebammen und Entbindungsangestellte für den Praxisbedarf				
<b>Fenoxazolin</b>	NT NS	0,1 % 0,1 %	2–3 × tägl. 1–3 Tropfen in jede Nasenhöhle 2–3 Applikationen tägl. Nasentropfen f. Kinder 0,05 %	
<b>Fenproporex</b>	p.o.	10 mg	Vor dem Frühstück und Mittagessen. Möglichst nicht abends	Rp, BtM*)
*) ausgenommen in Zubereitungen bis zu 11 mg je abgeteilte Form				
<b>Fentanyl</b>	i.v.  TTS  sublingual, buccal NS	0,3 mg  4,125– 34,65 mg  0,1 mg  0,05– 0,2 mg	Bis 0,7 mg zur Einleitung einer Neuroleptanalgesie. Zur Erhaltung: 0,05–0,1 mg 0,025–0,15 mg/h, individuell  Initial: 1 × tägl. 0,1 mg; Steigerung ggf. erforderlich Initial: 1 × tägl. 0,05 mg, Steigerung ggf. erforderlich	Rp, BtM
<b>Fenticlor</b>	Salbe, Lösung	5 %	2–3 × tägl. auftragen	A-
<b>Fenticonazol</b>	Creme, Lösung, Spray Ovula	2 %  600 mg	1–2 × tägl. auftragen  Einmaldosis: 600 mg; ggf. Wiederholung nach 3 Tagen	Rp
<b>Fentoniumbromid</b>	p.o.	0,02 %	3 × tägl.	Rp
<b>Fenzyramidol</b>	siehe Phenzyramidol			

Arzneistoff mit Höchstdosen	Applikation	Einzel-dosis, Konz.	Dosierungshinweise, Bemerkungen	Status
<b>Ferristen</b>	p.o.	6000 mg	2–4 × 6000 mg in je 30 min Abstand vor der Untersuchung	Rp
<b>Ferucarbotran</b>	i.v.	540 mg/ml	Unter 60 kg KG: 0,9 ml entspr. 0,45 mmol Eisen. Über 60 kg KG: 1,4 ml entspr. 0,7 mmol Eisen	Rp*)
*) zur Darstellung herdförmiger Leberschäden in der Magnet-Resonanz-Tomographie				
<b>Fesoterodinfumarat</b>	p.o.	4 mg ret.	Initial: 1 × tägl. 4 mg; Erhöhung: ggf. auf 1 × tägl. 8 mg erforderlich. Cave: bei eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion	Rp
<b>Fexofenadin-hydrochlorid</b>	p.o.	120–180 mg	Ab 12 Jahre: 1 × tägl. 120–180 mg, Kinder: 6–11 J.: 2 × tägl. 30 mg	Rp
<b>Fibrinogen (Blutgerinnungsfaktor I)</b>	i.v. Infusion	1000 mg	Langsam in 100 ml Infusionslösung infundieren. Fibrinogenblutspiegel kontrollieren	Rp
<b>Fidaxomicin</b>	p.o.	200 mg	Erw. und Kdr. ab 25 kg KG: 2 × tägl. 200 mg, Abstand mögl. 12 Std. Cave: bei eingeschränkter Leber- und Nierenfunktion	Rp
<b>Filgotinibmaleat</b>	p.o.	200 mg	Erw.: 1 × tägl. 200 mg; bei Patienten über 75 J. 1 × tägl. 100 mg als Anfangsdosis. Cave: bei mittelschwerer Niereninsuffizienz Dosisreduktion auf 1 × tägl. 100 mg, keine Anwendung bei schwerer Leber- und Niereninsuffizienz	Rp
<b>Filgrastim</b>	s.c. i.v.	5 µg/kg KG	1 × tägl. 5 µg/kg KG frühestens 24 h nach Chemotherapie Dosierung bei besonderen Indikationen siehe Fachinformation	Rp
<b>Finasterid</b>	p.o. p.o.	5 mg 1 mg	Prostatahyperplasie: 1 × tägl. 5 mg Androgenetische Alopezie: 1 × tägl. 1 mg über 3–6 Monate bei Männern im Alter von 18–41 Jahren	Rp
<b>Fingolimod-hydrochlorid</b>	p.o.	0,5 mg	Erw., Kdr. u. Jugendl. ab 10 J.: 1 × tägl. 0,5 mg	Rp
<b>Flavoxat</b>	p.o.	100 mg	3–4 × tägl.	
<b>Flecainid</b>	p.o. i.v.	50–100 mg 50 mg	2 × tägl. 50–100 mg, initial doppelte Dosis Langsam injizieren. Cave: bei älteren Menschen (Priscus-Liste)	Rp
<b>Fleroxacin</b>	p.o., i.v.	400 mg	1 × tägl. 400 mg p.o. oder i.v.	Rp
<b>Floctafenin</b>	p.o.	200 mg	3 × tägl.	

Arzneistoff mit Höchstdosen	Applikation	Einzel-dosis, Konz.	Dosierungshinweise, Bemerkungen	Status
<b>Florbetaben (<sup>18</sup>F)</b>	i.v.	300 MBq	1 × 300 MBq mit einer Infusionsgeschwindigkeit von 1 ml/6 Sek., die Mindestdosis darf 240 MBq, die Höchstdosis 360 MBq nicht unter- bzw. überschreiten	Rp
<b>Fluanison</b>	p.o. p.o.	1,5 mg 3 mg	3 × täglich als Sedativum 1 × (abends) als Einschlafmittel	Rp
<b>Flucloxacillin</b>	p.o.  i.m., i.v.	500 mg  500 mg	3–4 × täglich, 1 Std. vor oder 2 Std. nach dem Essen  4 × täglich. Cave: bei stark eingeschränkter Nierenfunktion (GFR < 10 ml/min) 1 g alle 8–12 Std. Kinder: 30–60 mg/kg KG/d auf 4 Einzeldosen verteilt	Rp
<b>Fluconazol</b>	p.o.  i.v.	100 mg  2 mg/ml	1. Tag: 1 × 400 mg; anschließend 1 × 200 mg täglich. Kinder: 3–12 mg/kg KG alle 72 Std.	Rp
<b>Flucytosin</b>	p.o. i.v. Infusion  Salbe	2500 mg 150 mg/kg KG  10 %	Erw.: alle 6 h 150 mg/kg KG/d Innerhalb 20–30 min, kombiniert mit Einnahme	Rp
<b>Fludarabin-5-dihydrogenphosphat</b>	i.v.	30 mg/m <sup>2</sup> KOF	5 × jeweils 5 Tage hintereinander in Abständen von 28 Tagen, Gesamtdosis: 150 mg/m <sup>2</sup> KOF	Rp
<b>Fludrocortison</b>	p.o.  Injektion (Kristall-susp.) AS Salbe	0,1 mg  0,3 %  0,05 % 0,1 %	Initial 2 × morgens, 1 × mittags, dann abbauen auf 2 × täglich. Individuell einstellen Intraartikulär und in entzündetes Gewebe (bis 2 ml)  2 × täglich auf erkrankte Hautstellen auftragen	Rp
<b>Fludroxycortid</b>	Folie Salbe, Creme Lotio	4 µg/cm <sup>2</sup> 0,025 %  0,05 %		Rp
<b>Flufenaminsäure</b>	p.o.  Gel *) ausgenommen kutane Anwendung	100 mg  3 %	Zu Beginn: 3 × 200 mg. Erhaltungsdosis 3 × 100 mg. Patienten unter 45 kg: 10 mg/kg KG/d. Nicht für Kinder  2–3 × täglich auftragen	Rp*)
<b>Flumazenil</b>	i.v.	0,2 mg	Initial: 0,2 mg i.v. innerhalb von 15 Sek., ggf. 0,1–0,2 mg in Minutenabständen nacheinjizieren bis 1 mg Gesamtdosis. Kinder über 1 J. initial: 0,01 mg/kg KG (bis max. 0,2 mg) in 15 Sek.; nach 45 Sek. Folgedosen: 0,01 mg/kg KG (bis max. 0,2 mg). Bei Bedarf alle 60 Sek. bis zu 4 × (Gesamtdosis 0,05 mg/kg KG oder 1 mg)	Rp

Arzneistoff mit Höchstdosen	Applikation	Einzel-dosis, Konz.	Dosierungshinweise, Bemerkungen	Status
<b>Flumedroxon</b>	p.o.	1 mg	3 × tägl. 4–6 Tage vor der Menstruation	Rp
<b>Flumetasol-21-pivalat</b>	Salbe, Creme, Lotio, Schaum	0,02 %	Mehrmals tägl.	Rp
<b>Flunarizin</b>	p.o.	10 mg	1 × abends. In schweren Fällen zu Beginn 4 Wochen lang 2 × tägl. (morgens und abends)	Rp
<b>Flunisolid</b>	NS	0,025 %	1 × abends, je 1 Sprühstoß in die Nasenlöcher. Max. 12 Sprühstoß/e/d	Rp
<b>Flunitrazepam</b>	p.o. i.m. i.v. i.v. Infusion	0,5–1 mg 1 mg 0,5 mg 1 mg 2 mg	1 × 0,5–1 mg abends kurz vor dem Schlafengehen Zur Narkosevorbereitung Zur Prämedikation Zur Narkoseeinleitung In 250 ml isotonischer Kochsalz- oder Glucoselösung. Cave: bei älteren Menschen (Priscus-Liste)	Rp, BtM
<b>Fluocinolonacetonid</b>	Salbe, Lotio, Creme, Gel intravitreal	0,025 %	Je 2–3 × tägl. 1 × 190 µg als Implantat	Rp
<b>Fluocinonid</b>	Salbe, Creme, Lösung	0,05 %	1–2 × tägl. dünn auftragen	Rp
<b>Fluocortin</b>	Salbe	0,75 %	Initial 2–3 × tägl. auftragen, dann 1 × tägl.	Rp
<b>Fluocortinbutyl</b>	Salbe, Creme	0,75 %	1 × tägl. initial 2–3 × tägl.	Rp
<b>Fluocortolon-21-hexanoat</b>	p.o. Kristallsuspension Salbe, Creme Spray	10 mg 2,5 % 0,25 %	Individuell dosieren. Erw. initial: 40–60 mg als TD, Erhaltungsdosis: 5–20 mg 1 × (morgens). Kinder initial: 10–40 mg/d, Erhaltungsdosis: 2,5–15 mg/d, ggf. nur jeden 2. Tag Intraartikulär und zur Infiltration von entzündetem Gewebe Initial 2–3 × tägl., dann 1 × tägl.	Rp
<b>Fluorescein-Natrium</b>	AT i.v.	0,15 % 500 mg	1 Tropfen 10 % Lösung. Zu diagnostischen Zwecken	Rp*)
*) Bei parenteraler Anwendung				
<b>Fluorescindilaurat</b>	p.o.	345,5 mg (0,5 mmol)	Test-Einmaldosis	
<b>Fluorometholon</b>	AT	0,1 %	Bis 4 × tägl. Bei Bedarf initial stündl.	Rp

Arzneistoff mit Höchstdosen	Applikation	Einzel-dosis, Konz.	Dosierungshinweise, Bemerkungen	Status
<b>Ballotae nigrae herba</b>	p.o.	2,0–4,0 g	Als Aufguss, 3 × tägl.	
– extractum fluidum	p.o.	1,0–3,0 g	3 × tägl.	
– tinctura	p.o.	1,0–2,0 g	3 × tägl.	
<b>Balsamum peruvianum</b>	Salbe	5–20 %	Großflächig max. 10 %, max. eine Woche lang	
<b>Balsamum tolutanum</b>	p.o.	0,2 g	3 × tägl.	
<b>Bardanae radix</b>	p.o.	2,5 g	Zu 1 Tasse als Kaltansatz mit anschließender Abkochung für 30–60 min, 2–3 × tägl.	A-
<b>Barosmae folium</b>	p.o.	1,0 g	Zu 1 Tasse Aufguss, mehrmals tägl.	A-
– extractum fluidum	p.o.	1,0 g	Mehrmals tägl.	
<b>Basilici herba</b>	p.o. Breium-schlag	2,0–4,0 g 50 %	Zu 1 Tasse Aufguss, 2–3 × tägl.	A-
<b>Belladonnae folii extractum siccatum normatum</b>	p.o.	0,015– 0,03 g	1–3 × tägl.	Rp
– pulvis normatus	p.o.	0,05–0,1 g	1–3 × tägl. max. 0,6 g TD	
– tinctura normata	p.o.	0,6–1,0 ml	1–3 × tägl.	
<b>Belladonnae folium</b>	p.o.	0,05–0,1 g	1–3 × tägl.	Rp*)
*) ausgenommen zum äußeren Gebrauch Wegen der geringen therapeutischen Breite werden Belladonna-Drogen und daraus hergestellte Phytopharmaka heute nicht mehr verwendet				
<b>Belladonnae radix</b>	p.o. 200 mg, 600 mg (ÖAB 9)	0,05 g	10,0 g Abkochung 0,5 %	Rp*)
– extractum fluidum	p.o.	0,05 g		
*) Wegen der geringen therapeutischen Breite werden Belladonna-Drogen und daraus hergestellte Phytopharmaka heute nicht mehr verwendet.				
<b>Benzoe (tonkinensis)</b>	p.o. Räucherung Konservie-rungsmittel	0,05 g 20 % 2 %	Für Fette	
<b>Benzoës tinctura (20%)</b>	Mundspül. Verband-wasser Pinselung	0,2 % 10 % k. A.	10 Tropfen auf 1 Glas Wasser 10-fach verdünnt Unverdünnt	
<b>Bergamottae aetheroleum</b>	p.o. Extern	0,1 g 1 %		A-*)
<b>Bergeniae folium</b>	p.o.	4,0–5,0 g	Zur 15-min-Abkochung mit 200 ml Wasser; 3–4-mal tägl. 1 Esslöffel ca. 30 min vor den Mahlzeiten	

Arzneistoff mit Höchstdosen	Applikation	Einzel-dosis, Konz.	Dosierungshinweise, Bemerkungen	Status
<b>Betulae cortex extractum siccum</b>	Gel	10–20 % (72–88 mg Betulin/g)	Ca. 1 mm dick auf die Wundfläche auftragen, Dauer der Anwendung: bis 4 Wochen	Rp*)
*) zur Behandlung von oberflächlichen Hautwunden (Epidermis und obere Dermis) und Verbrennungswunden der Haut des Grades IIa bei Erwachsenen				
<b>Betulae folium</b>	p.o.	2–3 g	Zu 1 Tasse Aufguss, 3–4 x tägl.	A-*)
– extractum siccum	p.o.	0,25–1,0 g	Bis 4 x tägl. 0,25–1,0 g	
– pulvis	p.o.	0,65 g	2 x tägl. 0,65 g	
*) extern				
<b>Betulina pix</b>	p.o. Einreibung Salbe Pinselung	0,2 g 5 % 5 % k. A.	Unverdünnt	
<b>Bistortae rhizoma</b>	siehe Polygoni bistortae radix			
<b>Boldi folium</b>	p.o.	1,5 g	2–3 x tägl. als Aufguss; max. TD: 4,5 g	
– extractum fluidum	p.o.	1,0 g	1–3 x tägl.	
– extractum siccum	p.o.	0,2–0,4 g	2 x tägl.	
– tinctura	p.o.	2,0–4,0 g	3 x tägl.	
<b>Boraginis herba</b>	p.o.	1,0 g	Zu 1 Tasse Aufguss	AMG § 5, A-
– oleum raffinatum	p.o.	1,0 g	Erw.: 2–3 x tägl. 1 g, Kinder: 1–12 J.: 2 x tägl. 0,5 g	
<b>Bryoniae radix</b>	p.o.	1,0 g	Zu 1 Tasse Abkochung	A-
<b>Bursae pastoris herba</b>	p.o.	4,0 g	Zu 1 Tasse Aufguss, 2–4 x tägl.	
– extractum fluidum	p.o.	2,5 g	2–3 x tägl.	
– tinctura	p.o.	5,0 g	2–3 x tägl.	